COVID-19
증상 또는 노출이 있는 아동 평가

VDH VIRGINIA DEPARTMENT OF HEALTH
vdh.virginia.gov

부모 및 보호자용

* COVID-19 **증상***으로는 열(≥100.4 ° F) 또는 오한, 피로(평소보다 더 피곤함), 두통, 근육통, 기침, 코 막힘 또는 콧물, 새로운 미각 또는 후각 상실, 인후통, 숨이 참 또는 호흡 곤란, 복통, 설사, 메스꺼움 또는 구토, 새로운 식욕 부진 또는 영양 부족.

아이가 COVID-19 *의 증상으로 아프나요?

- 아니오 → 아이가 지난 14일간 COVID-19에 걸린 사람과 밀접한 접촉**이 있었나요?
  - 아니오 → 학교 등교 및/또는 보육 시설 등원
  - 예 → 학교 및 보육 시설용
- 예
  - 아이에게 새롭거나 특이한 증상 → 아이를 집에 머물게 하십시오. 의료 제공자에게 전화하십시오(임상 평가가 없는 경우, 아래 **돌아가기** 섹션 참조). 학교에 알립니다.
  - 아이에게 일반적인 증상(예: 알레르기, 편두통, 천식) 또는 알고 있는 진단(예: 중이염, 패혈성 인두염)으로 인한 증상 → 평소대로 치료를 받으십시오. 열이 있는 경우, 해열제 없이 최소 24시간 동안 열이 나지 않을 때까지 집에 있습니다. 최소 24시간은 집에 계십시오.

학교 및 보육 시설용

아이가 학교/보육 시설에서 COVID-19 * 증상을 보입니까?

- 아니오 → 아이가 지난 14일간 COVID-19에 걸린 사람과 밀접한 접촉**이 있었나요?
  - 아니오 → 정상적인 활동
  - 예 → 학교 및 보육 시설용
- 예
  - 아이에게 새롭거나 특이한 증상 → 다른 사람들과 분리합니다. 집으로 보내십시오. 임상 평가가 없는 경우 아래 돌아래
  - 증상에 대한 기타 설명 (예 : 만성 질환 또는 알고있는 진단)
  - 발열
    - 예 → 해열제 없이 24시간 이상 발열이 없을 때까지 집으로 보내십시오.
    - 아니오 → 정상적인 활동

** **밀접한 접촉은** COVID-19 환자로부터 6피트 이내에서 15분 또는 그 이상 긴 시간 동안 함께 있었거나 직접 호흡기 분비물에 대한 노출이 있는 경우를 의미합니다.
***지난 14일 동안 인구 100,000명당 50건 이상 사례 지역 정보는 여기를 클릭하십시오.www.vdh.virginia.gov/coronavirus/ key-measures/pandemic-metrics/school-metrics/

의료 제공자용

COVID-19 * 증상이 있는 아동을 위한 임상 평가 (ww w .cdc.gov / coronavirus / 2019-ncov / hcp / pediatric-hcp.html)

- 지난 14일 동안 인구 100,000명당 50건 이상의 발생 사례***가 있는 지역과 알려진 밀접한 접촉** 및 노출 없음 → 대체 진단을 고려하십시오. Te: 검사 · 그리고 COVID-19에 대한 be 배제는 임상적 의심 수준 및 검사 가용성에 따라 고려될 수 있습니다.
- 지난 14일 동안, 인구 100,000명당 50건 이상의 사례***가 발생한 지역에 노출 → COVID-19 검사 ·(및/또는 임상적으로 평가). 집에서 분리하십시오.
- 지난 14일 동안 COVID-19로 알려 지거나 의심되는 사람과의 밀접한 접촉 ** → 증상이 있는 경우 즉시 또는 COVID-19에 대해 노출 가능성이 있고 약 1주 후 COVID-19 테스트 · 증상이 없는 경우. 집에서 분리/격리합니다.

◆**검사** – PCR 또는 항원(Ag) 검사가 허용됩니다. Ag 검사가 음성이고 COVID-19에 대한 임상적 의심이 높으면, PCR로 확인하십시오. 이상적으로는 초기 Ag 테스트 2 일. PCR 검사를 사용할 수없는 경우, 임상 환자 분리를 권장할지 여부는 재량에 따라 사용할 수 있습니다.

- 음성 COVID-19 → **증상이 호전되고 아이가 해열제를 사용하지 않고 최소 24시간 동안 열이 없는 경우, 학교/보육 시설로 복귀할 수 있습니다.**
- 양성 검사 또는 COVID-19 진단 → 증상 발병 후 10일 동안 가정 분리 (또는 양성 판정일 테스트). 밀접 접촉자들을 격리합니다. → **10일 분리 후, 최소 24시간 동안 열이 나지 않고 증상이 호전되면 아동은 학교 및/또는 보육 시설로 돌아갈 수 있습니다.**
- 음성 COVID-19 또는 검사하지 않음 → 마지막 노출 후 14일 동안 분리하거나 증상 발병 10일 후
  - 증상이 나타나면, 재검사를 고려하십시오. 증상 발병 후 10일 동안 집에서 분리합니다. 밀접 접촉자들을 격리합니다.
  - **증상이 나타나지 않으면 학교 및/또는 보육시설로 15일째에 돌아갑니다.**

로 돌아가기 학교와 보육 시설

임상 평가가 수행되지 않은 경우

- 증상이 있지만 밀접한 접촉 **이 없고 지난 14일 동안 ≥100,000명당 50건 이상의 발생 사례***가 있는 지역에 노출 없음 → **해열제 없이 24시간 동안 열이 없는 경우 복귀합니다.**
- 증상 및 밀접한 접촉 **이 있거나 지난 14일 동안 100,000명당 50건 이상의 사례*** 발생 지역에 노출 10일 간의 자가 분리. → **10일 간의 자가 분리. 그런 다음 해열제 없이 24시간 동안 열이 없는 경우 복귀합니다. 밀접 접촉자들을 격리합니다.**
- 증상은 없지만 밀접한 접촉 **이 있음. → **14일 자가 격리. 증상이 없으면, 15일째에 복귀. 증상이 나타나면 10일 동안 분리하고 밀접 접촉자들을 격리합니다.**

10/08/2020